

前部缺血性视觉神经病变

2) 动脉炎前部缺血性视觉神经病变

动脉炎前部缺血性视觉神经病变并不常见。它由向视神经供血的动脉发炎引起，造成动脉阻塞，可能会致命。

巨细胞动脉炎是其中一个病因，会导致中及大动脉发炎。除了丧失视力，患者也可能出现以下症状：

- 头痛
- 太阳穴疼痛
- 头皮疼痛或刺痛
- 咀嚼时下颚疼痛
- 颈部疼痛
- 肩膀和臀部疼痛
- 全身疲劳
- 食欲不振
- 无故消瘦
- 发烧

医生将安排患者进行验血和太阳穴动脉活检，以做出诊断。

动脉炎前部缺血性视觉神经病变的治疗

动脉炎前部缺血性视觉神经病变患者必须立即通过口服或静脉注射大剂量的类固醇，以避免另一只眼睛丧失视力或中风。这种疾病通常会与风湿科医生共同治疗。

地图



此传单是协助患者了解特定眼部疾病、治疗或检测的一般指南。其信息并不能取代患者向眼科医生寻求咨询的需要。如有特定眼部疾病和/或问题，请向眼科医生求诊。

此传单的内容未经新加坡全国眼科中心许可，不得以任何形式制作。

信息在2023年7月印刷时正确无误

新加坡全国眼科中心公司注册号码：198900840W

新加坡全国眼科中心

第3医院道11号，新加坡邮区168751

预约服务: (65) 6227 7266 传真: (65) 6226 1884

电邮: appointments@sneec.com.sg

网址: www.sneec.com.sg

关注我们    

前部缺血性
视觉神经病变

多了解关于
**前部缺血性
视觉神经病变**


Tomorrow's Eye Care, Today®

 Singapore National
Eye Centre
SingHealth


前部缺血性视觉神经病变

什么是前部缺血性视觉神经病变？

前部缺血性视觉神经病变是一种因**血液供应不足（缺血）**导致视神经受损，进而造成一只眼睛突然失去视力的疾病。它也被称为“视神经中风”。



视神经负责将眼部接收的视觉信息传递到大脑。视神经里约120万的细纤维都依赖周边的血管供氧。



前部缺血性视觉神经病变有哪些类型及治疗方式？

前部缺血性视觉神经病变有两种类型，各种类型的症状都不一样。

1) 非动脉炎前部缺血性视觉神经病变


这是较常见的前部缺血性视觉神经病变。患者可能有一天睡醒时，感觉其中一只眼睛的部分视野被遮挡。一般上受影响的是下半部分的视野，患者通常不会感到疼痛。

风险因素包括：

- 小视神经盘（一般是自出生就在双眼存在的问题）
- 高血压
- 糖尿病
- 高胆固醇
- 抽烟
- 阻塞性睡眠呼吸暂停综合征
- 贫血或突然失血
- 血压突降
- 治疗勃起功能障碍的药物



正常的视神经盘



非动脉炎前部缺血性视觉神经病变患者的视神经盘

非动脉炎前部缺血性视觉神经病变的治疗

治疗的重点是**管理引起血管粥样硬化的潜在医疗问题**。患者应与家庭医生配合，确保高血压、糖尿病或高胆固醇等疾病得到良好的控制。患者也应该戒烟。

这将减少中风及心脏病发作等血管疾病的风险。

如果出现以下任何一种**阻塞性睡眠呼吸暂停综合征**的症状，请通知医生，以便他转介给睡眠专家治疗：

- 大声打鼾
- 白天过度嗜睡
- 早上醒来头痛
- 因喘气或窒息而惊醒
- 观察到睡觉时呼吸停止

目前并无任何疗法可以改善前部缺血性视觉神经病变患者的视力。医生可能会提供阿司匹林（一种抗血小板的药）处方，但没有证据显示这可有效保护另一只眼睛。

治疗后可能出现的结果

患者的视力在第一周可能会恶化，但之后应该会稳定下来。接下来，患者的视力和视野可能会保持不变或略有改善。