

Medication Information Leaflet

Tranexamic Acid

氨甲环酸

氨甲环酸的用途:

此药能促进人体止血功能。它能阻止纤维蛋白溶解并且稳固凝血块，以降低血液流速及流量。因此，它有利于月经过多的妇女减少经血量的流失，及帮助血友病患者止血等等。

氨甲环酸的副作用和应对方法

此药可能会引起一些较普遍的副作用。其中包括：

- 恶心，呕吐和腹泻
 - 饭后服用药能减轻此症状
- 头晕
- 肌肉酸痛

以上副作用常见于治疗初期并会逐渐淡化。但若持续太久或影响生活作息，请通知您的医生。

此药也可能会引起一些**罕见但严重**的副作用。其中包括：

- 视觉模糊、色觉异常（如：无法分辨周围的颜色）
- 单腿疼痛或肿胀、呼吸困难、身体一侧失去知觉
- 药物过敏：皮肤出现红疹、皮痒、脸部肿胀、呼吸困难

若发生以上的情况以及其他一切不寻常的症状，请立即停止服用并马上求医。

特殊指示

请在服用药物前确保：

- 没有对此药过敏
- 没有怀孕或是在哺乳
- 若欲服用任何其他药物，包括保健品或中药前，请咨询您的医生或药剂师。
- 已告知医生或药剂师所有的病历尤其是体内血栓栓塞、中风、惊风、肾脏疾病的病历。

就医时，也需告知医生您目前正在服用氨甲环酸 (tranexamic acid)

在服用此药时有什么要戒口的？

其他药物有可能会和此药起冲突，请在开始服之前向医生或药剂师咨询。

若看别的医生，请务必通知他您在服此药。

忘了服用该怎么办？

忘记服药会降低止血的功效。记起时，尽快补服。如果已接近下一次服药的时间，请勿补服。只需按日常服药的时间，服一个剂量即可。切勿服用双倍的药量来补回已漏服的药量！

存放方式

置放在阴凉、干燥的地方。避光、避热。

请置于儿童不易触及之处。

扔药之前请包裹在垃圾带里，再丢进垃圾桶。



Version 2

Last Review: 02/07/2021

Produced by Department of Pharmacy
KK Women's and Children's Hospital

PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.®